

SillCa Tytan to innowacyjne połączenie trzech pierwiastków odpowiadających za odporność i jakość **Twójch upraw**. Pierwiastki te są katalizatorami przemian chemicznych oraz składnikami budulcowymi ścian komórkowych roślin. Dzięki temu produkt ogranicza porażanie roślin wywołane przez grzyby oraz wykazuje działanie biostymulujące i odżywcze. Krzem odkładany w ścianach komórkowych tworzy fizjologiczną barierę dla patogenów.

SillCa Tytan rozwiązuje problemy związane z parametrami jakościowymi, poprawiając m.in. **jędrność owoców, trwałość pozbiorną owoców i warzyw, wielkość polaryzacji, zawartość skrobi, zaolejenie w rzepaku i słoneczniku.**

Dodatkowo wysoka zawartość dobrze przyswajanego wapnia **stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększa pobieranie P i K.**

* Produkt dedykowany również do upraw zakładanych na stanowiskach o niskim pH.



SillCa TYTAN

SPECJALISTYCZNY NAWÓZ DOLISTNY

Si

Ca

Ti



SillCa Tytan

z krzemem, wapniem i tytanem



W warunkach wahań temperatury,
szczególnie wysokich temperatur, reguluje pracę aparatów szparkowych zmniejszając parowanie wody z roślin. Na skutek tego roślina znacznie lepiej gospodaruje wodą.



Przyspiesza fotosyntezę,
wspomaga dynamikę procesów wzrostu.



Neutralizuje stres rośliny związany z zasoleniem gleby podczas okresowo występujących niedoborów wody.

Składniki (pierwotne surowce):

- 37,5 % CaO **Tlenek wapnia** (m/m)
- 21,5 % SiO₂ **Dwutlenek krzemu** (m/m)
- 1,9 % Fe₂O₃ **Trójtlenek żelaza** (m/m)
- 1,4 % MgO **Tlenek magnezu** (m/m)
- 1,2 % K₂O **Tlenek Potasu** (m/m)
- 0,3 % TiO₂ **Dwutlenek Tytanu** (m/m)
- 0,1 % MnO **Tlenek Manganu** (m/m)

Sposób, dawka i terminy stosowania:

Stosować w oprysku nalistnym:

Uprawa	Dawka (na 1 zabieg)	Termin i sposób stosowania:
Zboża	0,5-1 kg/ha	Jesień: - 28 dni przed końcem wegetacji. Wiosna: - początek wzrostu źdźbła, - faza liścia flagowego.
Rzepak	0,5-1 kg/ha	Jesień: 28 dni przed końcem wegetacji, Wiosna: - początek wzrostu pędu głównego, - koniec opadania płatków/ początek rozwoju łuszczyń.
Burak cukrowy	0,5-1 kg/ha	faza 4 rozwiniętych liści/kilka dni po ostatnim zabiegu herbicydowym - początek zakrywania międzyrzędzi, - wraz z kolejnymi zabiegami na chwościka
Ziemniak	0,5-1 kg/ha	faza 8 rozwiniętych liści - początek zakrywania międzyrzędzi, - 28 dni przed zbiorem
Kukurydza	0,5-1 kg/ha	faza 4-6 rozwiniętych liści/po ostatnim zabiegu herbicydowym
Owoce ziarnkowe	2 kg/ha	od końca kwitnienia do zbiorów co 10-14 dni
Owoce pestkowe	2 kg/ha	od końca kwitnienia do zbiorów co 10-14 dni
Owoce jagodowe	2 kg/ha	Jesień: w truskawce na w pełni wykształcone liście. Wiosna: - po wznowieniu wegetacji, - od rozwoju kwiatostanów do końca zbiorów.
Winorośl	2 kg/ha	po wznowieniu wegetacji, - od rozwoju kwiatostanów do końca zbiorów
Warzywa kapustne	1-2 kg/ha	faza 7-10 liści, - kolejne 2 aplikacje w fazie intensywnego rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru
Warzywa korzeniowe	1-2 kg/ha	faza 3-5 liści, - kolejne 2 aplikacje w fazie intensywnego rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru
Warzywa cebulowe	1-2 kg/ha	faza 3-5 liści, - kolejne 2 aplikacje w fazie intensywnego rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru